

アンチ・ドーピング情報

「2022年禁止表 糖質コルチコイド」について

(2024.01.01 改訂版)

2022年1月1日から**競技会時の糖質コルチコイド**の注射(*)、経口[口腔粘膜(口腔内(頬)、歯肉内、舌下等)を含む]、経直腸での使用はすべて**禁止**となりました。

2024年禁止表国際基準に経直腸使用のウォッシュアウト期間が明示されました。

(*)禁止される注射使用の例

静脈内、筋肉内、関節周囲、関節内、腱周囲、腱内、硬膜外、
髄腔内、滑液嚢内、病巣内(ケロイド等)、皮内および皮下

競技会外(時)に糖質コルチコイドを使用することは禁止されていませんが、競技会直前に使用した場合は、競技会時のドーピング検査時で禁止物質として検出される可能性があります。禁止表国際基準には体内から排出されるまでのウォッシュアウト期間(#)の目安が掲載されています。

糖質コルチコイド		
経路	糖質コルチコイド	ウォッシュアウト期間
経口** <small>**口腔粘膜、口腔内(頬)、歯肉内、舌下投与含む</small>	すべての糖質コルチコイド	3日
	但し、トリアムシロン；トリアムシロンアセトニド	10日
筋肉内	ベタメタゾン；デキサメタゾン；メチルプレドニゾン	5日
	プレドニゾン；プレドニソン	10日
	トリアムシロンアセトニド	60日
局所（関節周囲、関節内、腱周囲、腱内）	すべての糖質コルチコイド	3日
	但し、プレドニゾン；プレドニソン；トリアムシロンアセトニド；トリアムシロンヘキサトニド	10日
直腸	すべての糖質コルチコイド	3日
	但し、トリアムシロンジアセテート；トリアムシロンアセトニド	10日

(#)ウォッシュアウト期間

体内に吸収された薬物がほぼ全て排出される期間を示す。但し、個人差があるので、薬物が完全に排出されることを保証するものではない。

競技会前にウォッシュアウト期間を過ぎて糖質コルチコイドを使用した場合

競技会(時)ドーピング検査から検出された際に、速やかに遡及的TUE申請ができる体制をとっておいて下さい。事前の申請は不要です。